



Prewencja - dystrybucja jodku potasu

Data publikacji: 5 października 2022 godz. 09:50

We wtorek, 4 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Warszkowie odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omawiano procedury związane z przygotowaniem do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Sławno. Zgodnie z zapewnieniami rządu obecnie nie ma zagrożenia radiacyjnego dla naszego kraju, a spotkanie miało charakter wyłącznie organizacyjny, by móc przygotować się do ewentualnej dystrybucji jodku potasu w przypadku np. awarii elektrowni atomowych uszkodzonych w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Działania te to wyłącznie prewencja przewidziana w przepisach prawa na wypadek ewentualnego skażenia radiacyjnego.

Akcja dystrybucji preparatów medycznych zostanie rozpoczęta po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w tym zakresie. Z informacji przekazywanych przez MSWiA wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami na terenie Gminy Sławno planuje się uruchomić siedem punktów wydawania dawek preparatu ze stabilnym jodem dla ludności w poszczególnych miejscowościach i obiektach:

- Punkt w Szkole Podstawowej w Sławsku będzie obsługiwał mieszkańców miejscowości: Sławsko, Radosław, Tokary i Warginie.
- Punkt w Szkole Podstawowej we Wrześnicy będzie wydawał preparaty dla mieszkańców miejscowości: Wrześnica, Noskowo i Żabno.
- Punkt w Szkole Podstawowej w Warszkowie będzie obsługiwał mieszkańców miejscowości: Warszkowo, Warszkówko i Tychowo.
- Punkt w Szkole Podstawowej w Żukowie będzie wydawał tabletki z jodkiem potasu dla mieszkańców miejscowości: Żukowo, Łętowo, Janiewice, Chomic i Brzeście.
- Punkt w Szkole Podstawowej w Bobrowicach będzie obsługiwał mieszkańców miejscowości: Bobrowice, Bobrowiczki, Smardzewo, Rzyszczewo i Rzyszczewko.
- Punkt w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie będzie wydawał preparaty dla mieszkańców miejscowości: Gwiazdowo, Gwiazdówko, Pomiłowo i Kwasowo.
- Punkt w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie filia w Boleszewie będzie obsługiwał mieszkańców miejscowości: Boleszewo, Borzyszkowo, Grzybno, Przemysławiec, Pątnowo i Stary Kraków.

Zdjęcia dodane do wiadomości

DODATKOWE INFORMACJE

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl

JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletek zawierających wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyci karczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r. z: i dorośli powyżej 12 r. z: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r. z: 1 tabletkę (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r. z: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem



Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przelać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli masz nadczynność tarczycy
- jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę



PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

- w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
- w przypadku zwichnięcia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

- z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

